

癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名
対象疾患

Her+G-SOX

 進行・再発胃癌 (Her2発現)

 令和3年12月28日 EL-OHPが130mg/m²のレジメンを追加

催吐リスク 中等度

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

	薬剤名	量	投与方法
初回			
day1	①	パロノセトロンバッグ0.75mg/50mL+デカドロン6.6mg	30分で点滴
	②	生食250mL+注射用水40mL◎+ハーセプチン8mg/kg	90分以上で点滴
	③	5%ブドウ糖500mL+エルプラット100mg/m ² ※※	120分で点滴
	④	テルモ生食100ml	15分で点滴

2回目以降


day1	①	パロノセトロンバッグ0.75mg/50mL+デカドロン6.6mg	30分で点滴
	②	生食250mL+注射用水40mL◎+ハーセプチン6mg/kg	90分以上で点滴 ●
	③	5%ブドウ糖500mL+エルプラット100mg/m ² ※※	120分で点滴
	④	テルモ生食100ml	15分で点滴

- 初回の忍容性が良好なら、2回目以降は30分投与可。
- ◎ 60mgバイアル1Vあたり注射用水3.0mLで溶解
150mgバイアル1Vあたり注射用水7.2mLで溶解

	TS-1	内服
day1~day14	TS-1	
	TS-1	BSA < 1.25m ² 80mg/day を分2で内服
	※	1.25 ≤ BSA < 1.5m ² 100mg/day を分2で内服
		1.5m ² ≤ BSA 120mg/day を分2で内服

b) 投与スケジュール

1コース21日



※※ G-SOX(130)はエルプラット130mg/m²