

# 癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名	Her+XP
対象疾患	胃癌 (HER2過剰発現)
診療科	外科
登録日・登録者	

催吐リスク 高度
-------------

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

		薬剤名	量	投与方法
初回 day1	①	生食50mL		ルート確保用
	②	パロノセトロンバッグ0.75mg/50mL+デカドロン9.9mg		30分で点滴
	③	生食250mL+注射用水40mL◎+ハーセプチン8mg/kg		90分以上で点滴
	④	生食500mL+シスプラチン80mg/m <sup>2</sup>		120分で点滴
	⑤	ソルデム3A500mL		90分で点滴
	⑥	ソルデム3A500mL		90分で点滴
day2	①	ソルデム3A500mL		120分で点滴
	②	ソルデム3A500mL		120分で点滴
2回目以降				
day1	①	生食50mL		ルート確保用
	②	パロノセトロンバッグ0.75mg/50mL+デカドロン9.9mg		30分で点滴
	③	生食250mL+注射用水40mL◎+ハーセプチン6mg/kg		90分以上で点滴※
	④	生食500mL+シスプラチン80mg/m <sup>2</sup>		120分で点滴
	⑤	ソルデム3A500mL		90分で点滴
	⑥	ソルデム3A500mL		90分で点滴
day2	①	ソルデム3A500mL		120分で点滴
	②	ソルデム3A500mL		120分で点滴

※ 初回の忍容性が良好なら、2回目以降は30分投与可。  
 ※ 間隔が1週間以上空いた時には8mg/kgで再開(添付文書より)

◎ 60mgバイアル1Vあたり注射用水3.0mLで溶解  
 150mgバイアル1Vあたり注射用水7.2mLで溶解

day1~day14	ゼローダ錠 (2000mg/m <sup>2</sup> /日)	内服
※※	ゼローダ錠 BSA < 1.36m <sup>2</sup>	2400mg/day を分2で内服
	1.36 ≤ BSA < 1.66m <sup>2</sup>	3000mg/day を分2で内服
	1.66 ≤ BSA < 1.96m <sup>2</sup>	3600mg/day を分2で内服
	1.96m <sup>2</sup> ≤ BSA	4200mg/day を分2で内服

b) 投与スケジュール

1コース21日

