癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名	Bev+mFOLFOX6
対象疾患	大腸癌

催吐リスク
中等度

平成29年12月13日改訂
平成30年6月1日改訂（持続注入ポンプ充填量150mL→140mL）
令和5年1月31日改訂（アバスチン投与量5～10mg/kg→5mg/kgへ）

a)　投与薬剤名と投与量、投与方法

		薬剤名　　量	投与方法
day1	①	生食50mL	ルート確保
	②	生食100mL＋ベバシズマブBS　5mg/kg	90分で点滴※
	③	パロノセトロンバッグ0．75mg/50mL＋デカドロン6．6mg	30分で点滴
	④-1	5%ブドウ糖250mL＋エルプラット85mg/m^2	120分で点滴
	④-2	5%ブドウ糖250mL＋レボホリナート200mg/m^2	120分で点滴
	⑤	5%ブドウ糖50mL＋5－FU400mg/m^2	15分で点滴
	⑥	生食500mL＋5－FU2400mg/m^2	46時間で点滴
	もしくは	生食（total 140mLになるように）mL＋5－FU2400mg/m	46時間で持続注入ポンプにて投与
	⑦	生食100mL（持続注入ポンプを使用しない時のみ）	15分で点滴

※　初回が良好なら2回目からは60分で投与可能。
　　2回目が良好なら3回目以降からは30分で投与可能。

b)　投与スケジュール

1コース14日

Day