癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名	PER+DTX+Her
対象疾患	乳癌(HER2過剰発現)
診療科	外科
登録日•登録者	

催吐リスク

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

		薬剤名 量	投与方法
day1	1	生食250mL+パージェタ 840mg	60分で点滴
	2	生食250mL+注射用水40mL®+ハーセプチン 8mg/kg	90分で点滴
	3	生食100mL+デカドロン6.6mg	30分で点滴
	4	5%TZ250mL+ドセタキセル60mg/m² ※	60分で点滴
	(5)	生食100mL	15分で点滴

二回目以降

day1	1	生食250mL+パージェタ 420mg	30分で点滴
	2	生食250mL+注射用水40mL®+ハーセプチン 6mg/kg	90分で点滴※※
	3	生食100mL+デカドロン6.6mg	30分で点滴
	4	5%TZ250mL+ドセタキセル60mg/m² ※	60分で点滴
	⑤	生食100mL	15分で点滴

- ※※ 初回の忍容性が良好なら、2回目以降は30分投与可。
- 60mgバイアル1Vあたり注射用水3.0mLで溶解 150mgバイアル1Vあたり注射用水7.2mLで溶解

b) 投与スケジュール

1コース21日



※最高用量は75mg/m²

前回投与から6週間以上投与が遅れた場合は、改めて初回投与量の840mgで投与を行う。 なお、次回以降は420mgを3週間間隔で投与する(添付文書)。