癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名	PI (SCLC用量)	
対象疾患	小細胞肺癌	催吐リスク
		高度

			同皮
a) 投	与薬剤	名と投与量、投与方法	
		薬剤名 量	投与方法
day1	1	生食1000mL	120分で点滴
	2	パロノセトロンバッグ0. 75mg/50mL+デカドロン9. 9r	r 30分で点滴
	3	5%TZ250mL+イリノテカン60mg/m ²	90分で点滴
	4	マンニットールS 300mL	40分で点滴
	⑤	生食500mL+シスプラチン60mg/m ²	90分で点滴
	6	ソルデム3A 500mL	60分で点滴
	7	ソルデム3A 500mL+10%塩化ナトリウム1A+硫酸マグネシウム補正液8mEq	60分で点滴
day2, 3			
	1	生食100mL+デカドロン6.6mg	30分で点滴
	2	ビカネイト1000mL	240分で点滴
	3	ソルデム3A 500mL	120分で点滴
day8, 1	5		
	1	グラニセトロンバッグ3mg/100mL+デカドロン6.6mg	30分で点滴
	2	5%TZ250mL+イリノテカン60mg/m ²	90分で点滴
	3	生食100mL	15分で点滴

b) 投与スケジュール

1コース28日

