

癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名
対象疾患
診療科

CDDP+PEM+Bev
非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)
呼吸器内科

催吐リスク 高度

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

	薬剤名	量	投与方法
day1	①	生食50mL	ルート確保用
	②	生食1000mL	120分で点滴
	③	パロノセトロンバッグ0.75mg/50mL+デカドロン9.9mg	30分で点滴
	④	生食100mL+ペバシズマブBS15mg/kg	90分で点滴※
	⑤	生食★+ペトレキセド500mg/m ²	10分で点滴
	⑥	マンニトールS 300mL	40分で点滴
	⑦	生食500mL+シスプラチン75mg/m ²	90分で点滴
	⑧	ソルデム3A 500mL	60分で点滴
	⑨	ソルデム3A 500mL+10%塩化ナトリウム1A+硫酸マグネシウム補正液8mEq	60分で点滴

★ Total100mLになるように生食を抜いた後にペトレキセド必要量を混注

※ 初回が良好なら2回目からは60分で投与可能。
2回目が良好なら3回目以降からは30分で投与可能。

day2, 3

①	生食100mL+デカドロン6.6mg	30分で点滴
②	ヴィーンF 500mL	120分で点滴
③	ヴィーンF 500mL	120分で点滴
④	ヴィーンF 500mL	120分で点滴

◎ アプレピタント 125mg(day1)、80mg(day2&3)内服

- ペトレキセド投与一週間以上前から1日1回葉酸0.5mg/日を連日内服。
以後、ペトレキセド最終投与日から22日目まで連日内服を続ける。
- ペトレキセド投与一週間以上前からVB₁₂1mg/日を筋注。
以後、9週ごとに投与し、ペトレキセド最終投与日から22日目まで続ける。

b) 投与スケジュール

1コース21日

