

# 癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名 dd-TC+Bmab  
 対象疾患 卵巣癌  
 平成27年12月2日 変更

催吐リスク  
中等度

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

	薬剤名	量	投与方法
day1	①	レスタミン錠(10mg) 5錠	内服
	②	グラニセロンハッグ3mg/100mL+デカドロン9.9mg+ガスター20mg	30分で点滴
	③	5%TZ250mL+パクリタキセル80mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴
	④	5%TZ250mL+カルボプラチン(AUC=6)	60分で点滴
	⑤	生食100mL+アバステン15mg/kg	90分で点滴※
	⑥	生食100mL	15分で点滴

※ 初回が良好なら2回目からは60分で投与可能。  
 2回目が良好なら3回目以降からは30分で投与可能。

day8, 15

	①	レスタミン錠(10mg) 5錠	内服
▲	②	生食100mL+デカドロン6.6mg+ガスター20mg	30分で点滴
	③	5%TZ250mL+パクリタキセル80mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴
	④	生食100mL	15分で点滴

◎ フィルター付きルートを使用

b) 投与スケジュール

1コース21日

