癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名	TC+Her
対象疾患	乳癌（HER2過剰発現）
診療科	外科
登録日・登録者	

催吐リスク
中等度

a）　投与薬剤名と投与量、投与方法

		薬剤名　　量	投与方法
day1	①	グラニセトロンバッグ3mg/100mL＋デカドロン9．9mg	30分で点滴
	②	5%TZ250mL＋ドセタキセル75mg/m^2※	60分で点滴
	③	生食250mL＋エンドキサン600mg/m^2	60分で点滴
	④	生食50mL	15分で点滴
	⑤	生食250mL＋注射用水40mL◎＋ハーセプチン　8mg/kg	90分以上で点滴
	⑥	生食100mL	15分で点滴

※　乳癌の最高用量

二回目以降

day1	①	グラニセトロンバッグ3mg/100mL＋デカドロン9．9mg	30分で点滴
	②	5%TZ250mL＋ドセタキセル75mg/m^2※	60分で点滴
	③	生食250mL＋エンドキサン600mg/m^2	60分で点滴
	④	生食50mL	15分で点滴
	⑤	生食250mL＋注射用水40mL◎＋ハーセプチン　6mg/kg	90分以上で点滴※※
	⑥	生食100mL	15分で点滴

※※　初回の忍容性が良好なら、2回目以降は30分投与可。
◎　60mgバイアル1Vあたり注射用水3．0mLで溶解
　　150mgバイアル1Vあたり注射用水7．2mLで溶解

b）　投与スケジュール

1コース21日

Day